


95 usages homologués  
sur 39 cultures

Fongicide



Fongicide multicultures

# Barky®



Numéro d'autorisation  
N° 2070204

Composition  
80 % de Mancozèbe

Formulation  
WP (poudre mouillable)

Conditionnements disponibles  
Sac de 25 Kg

Toutes les infos sur  
[www.cheminova.fr](http://www.cheminova.fr)

 **CHEMINOVA**  
Agro France S.A.S  
Les Solutions **ALTERN'ACTIVES**

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**

### Usages et doses d'emploi homologués :

#### ARBORICULTURE :

|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| ABRICOTIER                   | Rouille du prunier, Tavelure                                       | 0,2 kg/hl |
| CASSISSIER                   | Anthraxnose, Rouille, Septoriose                                   | 2 kg/ha   |
| CERISIER                     | Cylindrosporiose   | 0,2 kg/hl |
| POMMIER                      | Tavelure   | 0,2 kg/hl |
| PRUNIER                      | Rouille du prunier, Tavelures du mirabellier                       | 0,2 kg/hl |
| PECHER                       | Rouille, Tavelure  | 0,2 kg/hl |
| POIRIER - COGNASSIER - NASHI | Entomosporiose, Rouille grillagée, Septoriose, Tavelure du poirier | 0,2 kg/hl |

#### VITICULTURE :

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| VIGNE | Black Rot, Mildiou, Rougeot parasitaire | 3,5 kg/ha |
|       | Excoriose                               | 0,3 kg/hl |

#### CULTURES MARAICHÈRES ET LEGUMIÈRES :

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| AIL                 | Mildiou de l'oignon                                 | 2 kg/ha             |
|                     | Rouille de l'ail                                    | 0,2 kg/hl           |
| ARTICHAUT           | Mildiou des composés, Ramulariose                   | 2 kg/ha             |
| ASPERGE             | Rouille   | 0,2 kg/hl           |
| AUBERGINE           | Mildiou   | 2 kg/ha             |
| CAROTTE             | Alternariose, Mildiou                               | 2 kg/ha             |
| CELERIS             | Septoriose  | 0,2 kg/hl           |
| CHOU                | Trait. du sol                                       | 18,75 kg/ha         |
|                     | Fonte des semis                                     |                     |
| CONCOMBRE           | Alternaria SP                                       | 2 kg/ha             |
|                     | Mildiou   | 2 kg/ha             |
| CORNICHON           | Alternaria SP, Mildiou                              | 2 kg/ha             |
| COURGETTE           | Anthraxnose, Mildiou                                | 2 kg/ha             |
| ECHALOTE            | Anthraxnose, Cladosporiose, Mildiou                 | 2 kg/ha             |
|                     | Botrytis squamosa                                   | 2,5 kg/ha           |
| FRAISIER            | Mildiou   | 2 kg/ha             |
|                     | Alternaria SP, Zythia fragariae                     | 2 kg/ha             |
| MELON               | Maladie des taches pourpres et rouges               | 0,2 kg/hl           |
|                     | Anthraxnose   | 0,2 kg/hl           |
| OIGNON              | Cladosporiose, Mildiou                              | 2 kg/ha             |
|                     | Botrytis squamosa                                   | 2,5 kg/ha           |
| SCORSONERE SALSIFIS | Mildiou   | 2 kg/ha             |
|                     | Rouille Blanche, Rouille des chicorées              | 2 kg/ha             |
| TOMATE              | Alternariose, Anthracnose, Cladosporiose, Pied noir | 2 kg/ha             |
|                     | Mildiou   | 0,2 kg/hl           |
| HARICOT             | Rouille du haricot                                  | 2 kg/ha             |
|                     | Anthraxnose   | 0,2 kg/hl           |
| LAITUE              | Mildiou des composées                               | 0,2 kg/hl           |
|                     | Trait. semences et/ou des plants                    | Mildiou de la mâche |
| MACHE               | Mildiou   | 6,25 g/kg           |
|                     | POIREAU   | Rouille             |
|                     |   | 2,5 kg/ha           |

#### CEREALES :

|        |                           |                                 |         |
|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|
| AVOINE | Trait. semences           | Charbon nu                      | 200 g/q |
| BLE    | Trait. semences           | Carie, Fusariose, Septoriose    | 200 g/q |
| ORGE   | Rouille brune, Septoriose |                                 | 4 kg/ha |
|        | Trait. semences           | Helminthosporiose (D.Gramineum) | 200 g/q |

#### AUTRES GRANDES CULTURES :

|                             |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| BETTERAVE POTAGERE ET BETTE | Cercosporiose, Ramulariose, Rouille        | 4 kg/ha        |
|                             | Mildiou                                    | 2 kg/ha        |
| BETTERAVES                  | Trait. semences                            | Phoma, Pythium |
|                             | Cercosporiose, Ramulariose, Rouille        | 600 g/q        |
| CHICOREE WITLOOF            | Prod. de chicons* Trait. des plants        | 4 kg/ha        |
|                             | Mildiou (PULVÉRISATION SUR COLLET)         | 0,015 kg/m²    |
| POIS DE CONSERVE            | Mildiou (TREMPAGE DES RACINES)             | 0,375 kg/hl    |
|                             | Prod. de racines* Trait. parties Aériennes | Rouille        |
| POIS PROTEAGINEUX PRINTEMPS |  | 2 kg/ha        |
|                             | Anthraxnose                                | 2 kg/ha        |
| POMME DE TERRE              | Trait. des plants                          | 2 kg/ha        |
|                             | Gale argentée                              | 0,3 kg/q       |
|                             | Rhizactone brun (EN PULVÉRISATION)         | 300 g/q        |
|                             | Trait. parties aériennes                   |                |
|                             | Alternariose                               | 2 kg/ha        |
|                             | Mildiou                                    | 0,2 kg/hl      |

#### CULTURES FLORALES :

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| CHRYSANTHEME | Ascochyte, Rouille blanche | 0,2 kg/hl |
| ROSIER       | Rouille                    | 0,2 kg/hl |

#### Numéro d'autorisation

N° 2070204

#### Composition

80 % de Mancozèbe

#### Formulation

WP (poudre mouillable)

#### Classification

- N - Dangereux pour l'environnement
- Xi - Irritant
- R37 Irritant pour les voies respiratoires.
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

95  
usages  
Homologués

sur 39  
cultures

#### Précautions au cours de l'emploi

#### DÉLAI AVANT RÉCOLTE :

**LAITUE** DAR : 21 jours  
Printemps / Été / Automne  
DAR : 28 jours  
Hiver  
Utilisation interdite en post plantation

**ARTICHAUT** DAR : 21 jours

#### Après emploi

**DRE :** 48 heures

**ZNT :** 5 mètres minimum