

Jokari®

Insecticide

**Soyons précis
contre les cicadelles**

- Excellent effet de choc (95 % des cicadelles détruites en moins de deux jours)
- Longue persistance d'action (4 semaines)
- Très grand confort d'utilisation (formulation EW)

 **CHEMINOVA**
Agro France S.A.S
Les Solutions **ALTERN'ACTIVES**

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI



Un excellent "effet choc"


Jokari® permet un arrêt immédiat du développement de la population au stade larvaire comme au stade adulte.



Une efficacité durable

Jokari® permet un excellent contrôle des populations de larves et d'adultes jusqu'à 4 semaines après le traitement avec une efficacité supérieure à 95 %.

Cicadelle de la flavescence dorée (nombre de formes mobiles/feuille)



Une grande sécurité d'utilisation*

- **Jokari®** est exempt de classement toxicologique
- **Jokari®** est non irritant grâce à sa formulation EW
- **Jokari®** est sans impact sur la fermentation, la composition des moûts et des vins, les qualités organoleptiques des vins et des eaux-de-vie.

Comment traiter avec Jokari® ?

La cicadelle de la flavescence dorée

Le traitement est obligatoire par Arrêté Préfectoral. Appliquez Jokari® dès le déclenchement des avis de traitement. La lutte s'effectue en général grâce à deux applications :

- **1^{er} traitement** : environ 30 jours après les premières éclosions,
- **2^{ème} traitement** : déclenché 20 à 30 jours après le premier.

Ces deux traitements larvicides couvrent la grande partie de la période des éclosions.

La cicadelle des grillures

Seules les observations dans les parcelles permettent de déclencher de façon utile les traitements.

- **Autour de la floraison**, le seuil se situe à 1 forme larvaire par feuille (échantillon moyen de 100 feuilles).
- **A la mi-juillet**, traiter dès le seuil de 50 larves/100 feuilles.

Conditions de traitement

Jokari® permet d'utiliser une dose commune et optimale de 0,2 l/ha en cas de lutte conjointe contre les deux cicadelles.

- Veiller à mouiller la végétation (y compris les pampres) de façon homogène.
- Éviter les traitements aux périodes les plus chaudes de la journée.
- Respecter un délai minimum de 21 jours entre la dernière application et la récolte.
- Afin d'éviter une accoutumance des parasites, il est recommandé de limiter le nombre d'applications de **Jokari®** à deux par an.

Une grande souplesse d'utilisation

- **Jokari®** s'utilise seul ou en programme⁽¹⁾ avec un régulateur de la croissance des insectes.
- **Jokari®** s'intègre efficacement dans un programme d'intervention contre les acariens.
- **Jokari®** a un impact modéré* sur la faune auxiliaire notamment sur Typhlodromes.

(1) se conformer aux mélanges autorisés sur le site <http://e-phy.agriculture.gouv.fr/wiphy/>

* dans le respect des usages autorisés et des bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires (se référer à l'étiquette).

 **CHEMINOVA**
Agro France S.A.S
Les Solutions **ALTERN'ACTIVES**