


ObsHerb n°04 – Zone Est


25 mars 2022

EVOLUTION DES SITUATIONS SUIVIES TOUTES PARCELLES CONFONDUES

PÉRIODE 4-11 / 03



PÉRIODE 18-25 / 03



DYNAMIQUE DE MARS




Aucune dicot. observée / Désherbage automne 2021



Dicot. observées / Désherbage automne 2021



Dicot. observées / Pas de désherbage automne 2021



Dicot. observées période 18-25/03 - Désherbage automne 2021

Seules 17% des situations ne présentent aucune dicot. aujourd'hui. 1 à 5 dicots différentes sont observées dans les parcelles désherbées à l'automne et le chardon domine. Les pressions sont partagées équitablement entre moins de 5 dicots unitaires/m² et plus de 5 dicots unitaires/m²

ObsHerb n°04 – Zone Est


25 mars 2022

EXPERTISES DESHERBAGE FMC

Temps de demi-vie (DT50) des molécules dans le sol :

Triflusulfuron	1 à 8 jours
Iodosulfuron ⁽¹⁾	2 à 15 jours
Thifensulfuron	3 à 10 jours
Tribénuron	7 à 15 jours
Clopyralid	12 à 28 jours
Metsulfuron	14 à 28 jours
Mésosulfuron	29 à 114 jours
Diflufénicanil	105 à 210 jours

⁽¹⁾se transforme en metsulfuron



BOTA'CLUB : NUISIBILITÉ DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8	Véronique de Perse	26.0
Folle avoine	5.3	Véronique F de L	44.0
Coquelicot	22.0	Lamier	44.0
Matricaire	22.0	Myosotis	66.0
Ray-Grass	25.0	Pensée	133.0
Vulpin	26.0	Alchémille	133.0
Stellaire	26.0		



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance
des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment,
sur la bonne cible

