


ObsHerb #1 – Région Rhône-Alpes



21 Février 2023

PRÉSENTATION DU SUIVI

22 agriculteurs partenaires répartis sur les départements de l'Ain et de l'Isère suivent la levée des adventices dicotylédones dans une de leur parcelle de blé tendre d'hiver.



Désherbage chimique à l'automne 2022

-  Oui
-  Non

55% ont dés herbé à l'automne (= 1 produit utilisé à minima, en pré-levée ou post levée)

45% n'ont pas dés herbé à l'automne

Un premier constat en cette mi-février...

40% observent des dicotylédones...

60% n'observent pas de dicotylédones ...


...qu'il y ait eu ou non dés herbage chimique à l'automne



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices




Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible



ObsHerb #1 – Région Rhône-Alpes

21 Février 2023

RÉPARTITION DES DICOTYLÉDONES SUR LES 40% AVEC PRÉSENCE



Les adventices dicotylédones observées étaient en majorité au stade 1 à 6 feuilles (60%) avec des émergences récentes (36% au stade cotylédons) qui vont s'amplifier dans les semaines à venir.

Les véroniques, matricaires, coquelicots, seneçons et mourons (rouge et blanc) restent le top 5 des dicotylédones observées à date.

A RETENIR



François Cochet
RTM Est
06 89 18 96 82

Pour ce premier bulletin bimensuel, nous constatons une part du désherbage d'automne majoritaire (55%) sur la Bresse, la Dombes, la plaine de Lyon et le plateau bas du Dauphiné. Il traduit bien souvent une problématique ray-grass qui reste le pilier du raisonnement du désherbage à l'automne sur la région. C'est une part qui approche d'année en année le taux moyen de traitement automnal (71% sur l'ensemble des zones françaises étudiées cette année).


Le suivi des adventices dicotylédones est capital dès la sortie d'hiver, nous verrons à partir du prochain bulletin la répartition de flore observée avec une clé d'entrée désherbage chimique ou non à l'automne.



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance
des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment,
sur la bonne cible



ObsHerb #1 – Région Rhône-Alpes


21 Février 2023

EXPERTISES DESHERBAGE FMC

BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®

- > Mesure facile et formulation stable
- > Solubilisation dans l'eau accrue
- > Plus rapide, plus d'activité
- > Rinçage pulvérisateur simplifié
- > Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

SX® complètement soluble dans l'eau :



Produit DF

1% en suspension dans l'eau

Produit SX®

1% en suspension dans l'eau



BOTA'CLUB : VÉRONIQUE À FEUILLES DE LIERRE | VÉRONIQUE DE PERSE

Véronique à feuilles de lierre

Cotylédons

Grands, ovales, à sommet arrondi, pétiolés et non échancrés.



Feuilles

Limbe de la première paire de feuilles présente 3 lobes marqués. Les suivantes sont divisées en 3 à 5 lobes.



Véronique de Perse

Cotylédons

Taille moyenne, forme triangulaire-arrondie, pétiolés et légèrement tronqués au sommet.



Feuilles

Premières feuilles opposées, les suivantes alternes. Feuilles ovales larges à grosses dents : entre 5 à 9 dents pour les feuilles adultes.



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible

