

# BULLETIN OBSHERB

#3 - Région Hauts de France

## A RETENIR




C. Brémard  
CRC Nord

Nous reconduisons, au travers du réseau Obsherb, le suivi des levées de chardons. **Depuis le dernier bulletin, nous observons des levées de chardons très dynamiques dans les parcelles du réseau. Le chardon est la 1<sup>ère</sup> adventice observée dans les parcelles, suivi du gaillet, de la renouée liseron et de la matricaire.**

Dans les prochaines semaines, nous vous tiendrons informés des évolutions afin de positionner au mieux les solutions anti-chardons et antidicotylédones de la gamme FMC.

## FOCUS SUR LE CHARDON

Flore observée dans les parcelles ObsHerb



### Quand déclencher son traitement anti-chardons ?

**Entre le stade 2 nœuds (BBCH32) et DFP (BBCH37)**

Depuis 2016, les essais de comptages hebdomadaires mettent en évidence une **dynamique de levée massive à cette période.**

De plus, entre le stade 2 nœuds et le stade DFP la **couverture de la céréale permet encore une bonne pénétration de la bouillie dans la végétation.**

Les levées de chardons se poursuivent, **le plateau de la dynamique de levée n'est pas atteint** sur les parcelles observées. Il est donc trop tôt pour intervenir.

Cependant la qualité d'implantation, la date de semis, la météo peuvent induire des **variations de stades des cultures d'une parcelle à l'autre.** Il est donc **essentiel d'observer vos parcelles.**

Suivi de la dynamique des levées de chardons - Hauts-de-France

